

5 FU (5 Fluoro-uracile)

Antimétabolite

Diluants : G5% ou NaCl 0.9%

Molécule non vésicante

Indications :

Adénocarcinome digestif (gastrique, colorectal, pancréatique)

Carcinomes épidermoïdes des VADS et œsophage

Prémédications :

Anti émétiques

NB : Effet potentialisateur de l'acide folinique

TOXICITES	CONDUITE A TENIR
<p>Digestives :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nausées, vomissements très fréquents G1-G2</i> • <i>Mucite, stomatite,</i> • <i>Diarrhées, ulcération gastro intestinale</i> 	<p>Vérifier prise du traitement anti émétique</p> <p>Hygiène buccale</p> <p>Réhydratation</p>
<p>Hématologique : J7-J14 (dose dépendante)</p> <p>Toutes les lignées</p>	<p>Nadir J10</p> <p>Eviction du collectif et personnes malades</p> <p>Surveiller apparition de fièvre</p>
<p>Alopécie</p>	<p>Conseils aux patients : achat prothèse capillaire, se faire couper les cheveux courts (chute moins spectaculaire), se laver les cheveux avant le cycle et 2-3 jours après le traitement.</p>
<p>Cutanée :</p> <p><i>rash, urticaire, photosensibilisation, desquamation palmoplantaire, hyper pigmentation</i></p>	<p>Protection solaire</p>
<p>Oculaire :</p> <p><i>conjonctivite, hypersécrétion lacrymale</i></p>	
<p>Cardiaque : (rare)</p> <p><i>angor, arythmie</i></p>	<p>Surveillance</p>
<p>Si diffuseur = « surveillance du diffuseur à domicile : sur PM, suivi IDE libérale, débranchement noter date et heure »</p>	