

AVASTIN®
BEVACIZUMAB

Anticorps monoclonal humanisé anti VEGF (↓
vascularisation des tumeurs)

Diluant : NaCl 0.9% exclusif

Molécule non vésicante

Indications :

Cancers du sein, colorectal, poumon, rein avancés ou métastatiques

Glioblastomes (situation hors AMM)

Modalité d'administration :

1^{er} cycle perf sur 90mn, 2eme cycle sur 60mn, et si bonne tolérance cure suivante sur 30mn

TOXICITES	CONDUITE A TENIR
Hématologique <ul style="list-style-type: none"> • <u>Epistaxis très fréquents</u> • <i>Hémorragies (vaginale, digestive, pulmonaire)</i> 	Information patient, surveillance ecchymoses Délai de 4 semaines pour une chirurgie Délai de 10 jours pour une CIP
Cardio-vasculaire <u>très fréquente</u> : <ul style="list-style-type: none"> • <u>Hypertension, thrombose</u> • <i>Infarctus</i> 	ECG de référence Surveillance surtout si HTA préexistante, personnes âgées et /ou avec ATCD cardiaques
Rénale <ul style="list-style-type: none"> • <u>Protéinurie +++</u> • <i>Syndrome néphrotique rare</i> 	Bandelette urinaire
<u>Retard à la cicatrisation</u>	
<u>Cutanée très fréquente</u> : <i>dermatite exfoliante, sécheresse cutanée, décoloration de la peau</i>	Information patient, surveillance
Digestive (peu fréquente) : <i>perforation digestive, douleurs abdominales, diarrhées, nausées, vomissements, stomatite</i>	Surveillance et conseils aux patients selon symptômes