

ADRIAMYCINE®
DOXORUBICINE

Intercalant : Anthracycline

Diluants : NaCl 0.9% ou G5%

CIP obligatoire

Molécule VESICANTE

Indications :

Sarcome, vessie, lymphome, poumons, leucémies, ovaires, estomac, sein

Prémédications :

Anti émétiques (sétrons + corticoïdes)

| TOXICITES | CONDUITE A TENIR |
|---|--|
| <p><u>Digestives très fréquentes (J5-J15) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nausées, vomissements G2</i> • <i>Mucite</i> | <p>Contrôler la bonne prise des traitements anti émétiques</p> <p>Hygiène buccale</p> |
| <p><u>Alopécie très fréquente</u></p> | <p>Conseils aux patients : achat prothèse capillaire, se faire couper les cheveux courts (chute moins spectaculaire), se laver les cheveux avant le cycle et 2-3 jours après le traitement.</p> |
| <p><u>Hématologique très fréquente</u></p> <p>Toutes les lignées</p> | <p>De J7 à J11</p> <p>Eviction du collectif et personnes malades</p> <p>Surveiller apparition de fièvre</p> |
| <p>Cardiaque (toxicité aigüe et chronique)</p> | <p>Notion de dose cumulée (550mg/m²)</p> <p>Surveillance cardiaque notamment chez patient à risque</p> <p>Prévention secondaire éventuelle par CARDIOXANE si ttt antérieur par anthracyclines en situation métastatique</p> |
| <p>Cutanée (moins fréquent) : <i>érythème, brûlure, hyperpigmentation</i></p> | <p>Au bout des doigts ou des ongles</p> |
| <p>Coloration temporaire en rouge des urines</p> | <p>Prévenir le patient</p> |