

AMETYCINE®
MITOMYCINE C

Alkylant

Diluants : NaCl 0.9% ou G5%

Molécule VESICANTE

Indications :

Cancer colorectal, canal anal, vessie (intravésical)

TOXICITES	CONDUITE A TENIR
<p><u>Hématologique fréquente</u></p> <p><i>Gb, plq</i></p>	<p>G2-G3</p> <p>Eviction du collectif et personnes malades</p> <p>Surveiller apparition de fièvre</p>
<p><u>Digestive fréquente :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nausées, vomissements</i> • <i>Diarrhées, douleurs abdominales</i> • <i>Mucites</i> 	<p>Vérifier prise traitement antiémétique éventuel</p> <p>Hygiène buccale</p>
<p><u>Hypersensibilité fréquente</u></p> <p><i>Rashes, hyperthermie</i></p>	<p>Surveillance</p> <p>AntiH1 et antipyrétique si besoin</p>
<p><u>Locale fréquente</u></p> <p><i>Veinites, réactions cutanées, eczéma</i></p>	<p>Mettre la veine au repos – Pansement alcoolisé, AINS percutané</p>
<p>Alopécie G1</p>	<p>Conseils aux patients : achat prothèse capillaire, se faire couper les cheveux courts (chute moins spectaculaire), se laver les cheveux avant le cycle et 2-3 jours après le traitement.</p>