

CAELYX® DOXORUBICINE LIPOSOMALE PEGYLEE	Intercalant : anthracycline
--	-----------------------------

Diluant : G5% uniquement
Molécule VESICANTE

Indications :

Cancer ovaire, sein métastatique (pas au CHU), myélome

Prémédications :

Antiémétiques, corticoïdes

TOXICITES	CONDUITE A TENIR
<b><u>Hématologique très fréquente :</u></b> Toutes les lignées	Eviction du collectif et personnes malades Surveiller apparition de fièvre
<b><u>Digestives très fréquente:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nausées, vomissement</li> <li>• Mucite</li> </ul>	Vérifier prise du ttt antiémétique Hygiène buccale
<b><u>Alopécie très fréquente</u></b>	Conseils aux patients : achat prothèse capillaire, se faire couper les cheveux courts (chute moins spectaculaire), se laver les cheveux avant le cycle et 2-3 jours après le traitement.
Cutanée fréquente : <i>Syndrome main-pieds, radiodermite secondaire</i>	Conseils et surveillance : Hydratation des extrémités (crème émolliente) Vêtements adaptés (chaussette en coton, pas de chaussures serrées) Toilette : savons doux, eau tiède Eviter les frottements
Malaise fréquent <i>Céphalées, frissons, dyspnée, œdème, hypotension</i>	Diminuer la vitesse de perfusion
Hypersensibilité fréquente	Traitement symptomatique