

**CAMPTO®
IRINOTECAN**

**Inhibiteur de la topoisomérase 1 : enzyme de la
réparation de l'ADN**

Diluants : NaCl 0.9% et G5%

Molécule non vésicante

Indications :

Cancer colorectal avancé

Prémédications :

30 minutes avant la pose du produit injection sous cutané de sulfate d'atropine

TOXICITES	CONDUITE A TENIR
<p><u>Syndrome cholinergique fréquent :</u> <i>Hypersalivation, hypersudation, hypotension, malaise, larmes</i></p>	<p>Contrôler la prise d'atropine</p>
<p><u>Digestive fréquente :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nausées, vomissements G2-G3</i> • <i>Diarrhées, crampes abdo</i> • <i>Stomatite</i> 	<p>Vérifier prise ttt antiémétiques Traitement symptomatique</p>
<p><u>Hématologique fréquente :</u> Toutes les lignées</p>	<p>Nadir J8-J12 Eviction du collectif et personnes malades Surveiller apparition de fièvre</p>
<p><u>Alopécie fréquente</u></p>	<p>Conseils aux patients : achat prothèse capillaire, se faire couper les cheveux courts (chute moins spectaculaire), se laver les cheveux avant le cycle et 2-3 jours après le traitement.</p>