

FARMORUBICINE®
EPIRUBICINE=EPIADRIAMYCINE

Intercalant : Anthracycline

Diluants : NaCl 0.9% ou G5%

Molécule VESICANTE

Indications :

Sein, ovaire, poumons, estomac, sarcome

Prémédications :

Anti émétiques (sétrons + corticoïdes)

TOXICITES	CONDUITE A TENIR
<p><u>Digestive très fréquente :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nausées, vomissements G2-G3</i> • <i>Mucite</i> 	<p>Contrôler la bonne prise des ttt anti émétiques</p> <p>Hygiène buccale</p>
<p><u>Alopécie</u></p>	<p>Conseils aux patients : achat prothèse capillaire, se faire couper les cheveux courts (chute moins spectaculaire), se laver les cheveux avant le cycle et 2-3 jours après le traitement.</p>
<p><u>Hématologique</u></p> <p><i>Leuco et thrombopénies</i></p>	<p>Nadir J7-J14</p> <p>Eviction du collectif et personnes malades</p> <p>Surveiller apparition de fièvre</p>
<p>Cardiaque (toxicité aigüe et chronique)</p>	<p>Notion de dose cumulée (900mg/m²)</p> <p>Surveillance cardiaque notamment chez patient à risque</p> <p>Prévention secondaire éventuelle par Dexrazoxane CARDIOXANE si ttt antérieur par anthracyclines</p>
<p>Coloration temporaire en rouge des urines (1 à 2 jours)</p>	<p>Prévenir le patient</p>