

ERBITUX® CETUXIMAB	Anticorps monoclonal chimérique (humain / murin) : RISQUE ALLERGIQUE+++ O2 et lit strict pour le 1^{er} passage de la molécule
-------------------------------	---

Pas de diluant au CHU (Nac 0.9% possible)
Molécule non vésicante

Indications :

Cancer colo rectal métastatique, ORL (+ radiothérapie)

Prémédications :

30 minutes avant : antihistaminique H1 IV type polaramine + methylprednisolone IV 1mg/kg

NB : Administration de 2 heures pour les posologies de 400 mg/m² et de 1 heure pour 250 mg/m²

TOXICITES	CONDUITE A TENIR
<p><u>Hypersensibilité fréquente</u></p> <p><u>Pouvant aller jusqu'au bronchospasme</u></p>	<p>Vérifier la bonne prise de la prémédication, prendre les constantes</p> <p>Ralentir la perfusion si besoin</p> <p>Si sévère : stop perfusion, corticoïdes, bronchodilatateurs, O2 et catécholamines.</p>
<p><u>Cutanée très fréquente (réversible):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dermatite exfoliante, sécheresse cutanée, prurit</i> • <i>Dermatite acnéiforme, inflammation</i> • <i>Photosensibilisation</i> • <i>Onycholyse</i> 	<p>Hydratation de la peau avec crème émolliente, savon sur gras</p> <p>Dermocorticoïdes possibles, ttt antibiotique per os si surinfection</p> <p>Ecran total si exposition au soleil, protection avec des vêtements</p>
<p><u>Asthénie, fatigue très fréquente</u></p>	<p>Adapter son mode de vie, se fixer des priorités</p> <p>Prudence en voiture</p>
<p><u>Pulmonaire fréquente</u></p> <p><i>Dyspnée, pneumopathie interstitielle</i></p>	<p>Surveillance surtout chez patient à risque</p>