

VEPESIDE®
ETOPOSIDE

Inhibiteur de la topoisomérase II

Diluants : NaCl 0.9% ou G5%

Molécule non vésicante

Indications :

Tumeurs germinales, poumons, lymphomes, leucémies, tumeurs endocrines

Prémédications :

Anti histaminique, anti émétique

NB : Incompatibilité avec le PVC

TOXICITES	CONDUITE A TENIR
<p><u>Hématologique très fréquente :</u> leucopénie</p>	<p>Nadir J7-J10 Eviction du collectif et personnes malades Surveiller apparition de fièvre</p>
<p><u>Digestive très fréquente :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nausées, vomissements G1-G2</i> • <i>Mucites</i> 	<p>Vérifier prise ttt antiémétique, Hygiène buccale</p>
<p>Alopécie fréquente</p>	<p>Conseils aux patients : achat prothèse capillaire, se faire couper les cheveux courts (chute moins spectaculaire), se laver les cheveux avant le cycle et 2-3 jours après le traitement.</p>
<p>Hypersensibilité : <i>Hyperthermie, bronchospasme, dyspnée</i></p>	<p>Vérifier prise ttt anti histaminique, surveillance pouls tension, température, état, cutané par rapport au risque de choc anaphylactique</p>
<p>Locale : <i>Veinite, thrombophlébite</i></p>	<p>Mettre la veine au repos – Pansement alcoolisé, AINS percutané</p>