

**HERCEPTIN®
TRASTUZUMAB**

**Anticorps monoclonal d'origine humaine (dirigé
contre HER 2)**

Diluant : NaCl 0.9% uniquement

Molécule non vésicante

Indications :

Cancer du sein surexprimant HER2, estomac métastatique

Prémédications :

Administration en 90 min à la première perf puis 30 min pour les suivantes en cas de bonne tolérance

TOXICITES	CONDUITE A TENIR
<u>Digestive très fréquente:</u> <i>Nausées, vomissements G2</i>	traitement anti émétique si besoin
<u>Hypersensibilité très fréquente :</u> <i>Fièvre, frisson, céphalée, prurit, rush, hypo/hypertension</i>	Vérifier la bonne prise de la prémédication, surveillance de l'apparition de fièvre/frissons, prise des constantes Ralentir la vitesse de perf si besoin
<u>Douleur abdo, asthénie, frissons, fièvre, sd pseudo-grippal, malaise, arthralgie, myalgies, perte de poids très fréquents</u>	Surveillance
Cardiaque fréquente: <i>Arythmie, IDM, insuffisance cardiaque, tachycardie</i>	Surveillance tous les 3 mois Jamais d'ANTHRACYCLINES en même temps
Pulmonaire fréquente <i>Dyspnée, bronchospasme, pneumopathie, insuffisance respiratoire</i>	Traitement symptomatique