

HOLOXAN®
Ifosfamide

Alkylant (moutarde à l'azote)

Diluants : NaCl 0.9% ou G5%

Molécule non vésicante

Indications :

Sarcomes, lymphomes, leucémies aiguës, tumeurs germinales

Prémédications :

Antiémétiques

NB : Ne jamais mélanger à du bicarbonate

TOXICITES	CONDUITE A TENIR
<p><u>Digestive très fréquente :</u> <i>Nausées, vomissements G2</i> <i>Stomatite</i></p>	<p>Vérifier prise ttt antiémétique Hygiène buccale</p>
<p><u>Cystite hémorragique très fréquente</u></p>	<p>Hydratation+++ (au moins 4 litres/24h) Alcalinisation des urines Association systématique au Mesna (uroprotecteur)</p>
<p>Neurotoxicité</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Convulsions, somnolence, stupeur, ataxie, désorientation, coma</i> • <u>Encéphalopathie très fréquente</u> 	<p>Apparition en qq heures ou qq jours, réversible Injection de bleu de méthylène (cf protocole médical)</p>
<p>Alopécie fréquente</p>	<p>Conseils aux patients : achat prothèse capillaire, se faire couper les cheveux courts (chute moins spectaculaire), se laver les cheveux avant le cycle et 2-3 jours après le traitement.</p>
<p>Hématologique (leuco et thrombopénie)</p>	<p>Nadir 7-14 jours Eviction du collectif et personnes malades Surveiller apparition de fièvre</p>
<p>Rénale : (rare) <i>Tubulopathie, IR</i></p>	<p>Adaptation posologique</p>