

**HYCAMTIN®
TOPOTECAN**

Inhibiteur de la topoisomérase I, induit et stabilise la coupure de l'ADN

Diluants : NaCl 0.9% ou G5%

Molécule non vésicante

Indications :

Cancer de l'ovaire avancé, utérus, poumon

Prémédications :

Antémétique non systématique, selon sensibilité du patient

TOXICITES	CONDUITE A TENIR
<p><u>Hématologique très fréquente</u> Toutes les lignées</p>	<p>Réversible et non cumulative – Nadir J9-J16 Eviction du collectif et personnes malades Surveiller apparition de fièvre</p>
<p>Digestive très fréquente :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diarrhées sévères • Nausées, vomissements G2-G3 	<p>Anti-diarrhéiques et réhydratation Vérifier la bonne prise du traitement anti émétique</p>
<p><u>Alopécie très fréquente</u></p>	<p>Conseils aux patients : achat prothèse capillaire, se faire couper les cheveux courts (chute moins spectaculaire), se laver les cheveux avant le cycle et 2-3 jours après le traitement.</p>
<p><u>Asthénie très fréquente</u></p>	<p>Adapter son mode de vie, se fixer des priorités Prudence en voiture</p>