

MYOCET®
DOXORUBICINE LIPOSOMALE

Anthracyclines

Diluant : NaCl 0.9% ou G5%

CIP obligatoire

Molécule VESICANTE

Indications :

Cancer du sein métastatique

Prémédications :

Anti émétiques

TOXICITES	CONDUITE A TENIR
Alopécie	Conseils aux patients : achat prothèse capillaire, se faire couper les cheveux courts (chute moins spectaculaire), se laver les cheveux avant le cycle et 2-3 jours après le traitement.
Digestives : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nausées, vomissements G1-G4</i> • <i>Mucite, diarrhée (1 patient sur 5)</i> 	Vérifier ttt antiémétique Vérifier la bonne prise des antiémétiques, surveillance de l'hygiène buccale
Douleurs dorsales	Arrêt de la perfusion, antalgique, reprise si possible
Cutanée : <i>photosensibilisation</i>	Ecran total pendant tout le traitement
Hématologique (Toutes les lignées)	Eviction du collectif et personnes malades Surveiller apparition de fièvre
Cardiaque : <u>moins / doxorubicine d'où l'intérêt de la forme liposomale</u>	Surveiller ECG
Hypersensibilité : <i>Hypotension, fièvre, frissons, dyspnées, céphalées</i>	Diminuer la vitesse de perfusion si besoin