

**OXALIPLATINE®
ELOXATINE**

Alkylant : sel de platine

Diluant : G5% uniquement

Molécule VESICANTE

Indications :

Cancer colo rectal, voies biliaires, estomac

Prémédications :

- ✓ Anti émétiques
- ✓ 1g de gluconate de calcium + 1g de MgCl 30 mn avant et après

TOXICITES	CONDUITE A TENIR
<p><u>Digestive très fréquente :</u> <i>Nausées, vomissements G2-G3</i></p>	Vérification de la prise du traitement anti émétique
<p><u>Neurologique très fréquente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Fourmillements, perte de sensibilité au niveau des mains et des pieds</i> • <i>Crampes, contracture, priapisme</i> • <i>Faiblesse musculaire</i> 	<p>Toxicité limitante, cumulative et lentement réversible</p> <p>Evaluer et surveiller la motricité des mains et de la marche,</p> <p>Attention au chaud et froid par rapport aux paresthésies</p>
<p>Hypersensibilité fréquente : <i>frissons, rougeur, céphalées, prurit, dyspnée, vertiges, œdème, tachycardie, choc, hypotension</i></p>	Surveillance de l'état général du patient, des constantes
<p>Hématologique fréquente: <i>Anémie, thrombopénie</i></p>	<p>Eviction du collectif et personnes malades</p> <p>Surveiller apparition de fièvre</p>