

PACLITAXEL® TAXOL	Poison du fuseau : taxane
------------------------------	----------------------------------

Diluants : NaCl 0.9% ou G5%
Molécule VESICANTE

Indications :

Cancer du sein, ovaire, bronchique

Prémédications :

- ✓ Corticoïdes et anti histaminiques

NB : Incompatibilité avec PVC

TOXICITES	CONDUITE A TENIR
<u>Hématologique très fréquente</u> (toutes les lignées)	Nadir à J11 Eviction du collectif et personnes malades Surveiller apparition de fièvre
<u>Hypersensibilité immédiate :</u> <i>choc anaphylactique, flush, hypotension, tachycardie, réactions cutanées</i>	Surveillance de la bonne prise du traitement anti histaminique, surveillance pouls tension, température, état cutané par rapport au risque de choc anaphylactique
<u>Alopécie très fréquente</u> (Moins sévère en cas d'administration hebdomadaire)	Conseils aux patients : achat prothèse capillaire, se faire couper les cheveux courts (chute moins spectaculaire), se laver les cheveux avant le cycle et 2-3 jours après le traitement.
Cardiaque fréquente : <i>Troubles du rythme, hypo hyper tension</i>	Attention péricardite (rétention hydrique due au taxol)
Neurologique fréquente : <i>paresthésies mains/pieds G1-G4</i>	Dose dépendante, lentement réversible (adaptation des doses)
Digestive fréquente : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nausées, vomissements G1-G2</i> • <i>Mucites</i> 	Vérifier prise traitement antiémétique Hygiène buccale
Hépatique fréquente	Surveillance enzymes, bilirubine
Arthralgies, myalgies fréquentes : Bras, jambes	Réversibles