

TAXOTERE® DOCETAXEL	Poison du fuseau : taxane
--------------------------------	----------------------------------

Diluants : Nacl 0.9% ou G5%
Molécule VESICANTE

Indications :

Cancers poumon, gastrique, sein, prostate, VADS

Prémédications :

- ✓ Corticoïdes, anti histaminiques, anti émétiques

Nb : Eviter les perfuseurs en PVC

TOXICITES	CONDUITE A TENIR
<u>Hématologique très fréquente</u> (toutes les lignées cellulaires)	Nadir J5 à J8. Eviction du collectif et personnes malades Surveiller apparition de fièvre
<u>Digestive très fréquente</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nausées, vomissements G1-G4</i> • <i>Diarrhées, mucites</i> • <i>Douleurs abdominales</i> 	Vérification prise du traitement antiémétique Hygiène buccale <u>Risque de typhlite</u> (si associé à fièvre+neutropénie)
<u>Rétention hydrique très fréquente</u> <i>Œdèmes périphériques, ascite, épanchements, prise de poids</i>	Augmentée en cas de perfusions hebdomadaires
<u>Neurologique très fréquente</u> <i>Paresthésie, sensitive</i>	Réversibles et doses dépendantes
<u>Cutanée très fréquente</u> <i>Syndrome main pied, éruption, desquamation, coloration des ongles, abcès</i>	Hydratation des extrémités (crème émolliente) Vêtements adaptés (chaussette en coton, pas de chaussures serrées) Toilette : savons doux, eau tiède Eviter les frottements
<u>Fatigue très fréquente</u>	Augmentée si perfusions hebdomadaires Adapter son mode de vie, se fixer des priorités. Prudence en voiture
<u>Alopécie très fréquente</u>	Conseils aux patients : achat prothèse capillaire, se faire couper les cheveux courts (chute moins spectaculaire), se laver les cheveux avant le cycle et 2-3 jours après le traitement.
Hypersensibilité fréquente : <i>prurit, flush, hypotension, bronchospasme</i>	Prémédication indispensable