

YONDELIS® Trabectédine	Alkylant (alcaloïde d'origine marine)
-----------------------------------	--

Diluants : NaCl 0.9% ou G5%
Molécule VESICANTE

Indications :

Sarcomes, ovaires

Prémédications :

Antiémétiques

NB : Utilisation immédiate = stabilité de 24h et durée d'administration de 24h

TOXICITES	CONDUITE A TENIR
<u>Hématologique très fréquente</u> (toutes les lignées cellulaires)	Dose dépendante, réversible Nadir à J15
<u>Digestive très fréquente :</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nausées, vomissements G1-3</i> • <i>Diarrhées</i> 	Vérifier prise ttt antiémétique
<u>Fatigue très fréquente</u>	Adapter son mode de vie, se fixer des priorités Prudence en voiture
Hépatique fréquente : <i>Augmentation transa, bilirubine, PAL</i>	Surveillance
Arthralgies, myalgies	Traitement possible par paracétamol Surveiller CPK
Alopécie	Conseils aux patients : achat prothèse capillaire, se faire couper les cheveux courts (chute moins spectaculaire), se laver les cheveux avant le cycle et 2-3 jours après le traitement.
Veinite	Mettre la veine au repos – Pansement alcoolisé, AINS percutané